

2-lags Behandlerstrømpe - 6 måneders kompressionsgaranti

Størrelse: Str. 1-7 Kort længde og Str. 1-7 Standard længde.

Tå: Åben og lukket tå.

Kompression: Linerstrømpe, medi Ulcer liner 20 mmhg + yderstrømpe medi Ulcer Plus 20 mmhg.

Farver: Caramel

Materialer: mediven ulcer liner 73% Polyamid 27% Elastan
mediven ulcer plus, Yderstrømpe 75% Polyamid 25% Elastan

Anvendelse: Behandlerstrømpesæt, der tilsammen yder 40 mmhg.
Til behandling af venøse bensår.

CEAP: V-VI. Behandling af venøse ben sår
Behandling af blandingssår (arterielt og venøst)
Forebyggelse af tilbagefald, venøse ben sår.

Håndtering: Linerstrømpe kan vaskes ved 95°. Yderstrømpe kan vaskes ved max 40°. Begge kan tørres i tørretumbler ved lav varme.

Bortskaffelse: Almindelig renovation.

Forpakning og mindste salgsenhed: 1 sæt. Sættet består af 2 linerstrømper samt 1 yderstrømpe. Ved sæt med åben tå medfølger desuden en glidesok til påtagning. Ekstra linerstrømper kan købes separat. Engangsmålebånd med farvekode kan rekvireres.


Unspsc: 42142802

Tilsigtet formål: Rundstrikket kompressionsstrømpesystem til kompression af underekstremiteterne, hovedsageligt til behandling af sygdomstilfælde i venesystemet.

Godkendelser:



KL. 1



		Str. I	Str. II	Str. III	Str. IV	Str. V	Str. VI	Str. VII
Omkreds i cm	Under knæ cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
	Vrist cY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
	Ankel cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
Farvekode	Hæl	pink	blue	yellow	red	grey	green	brown
	Længde i cm	Kort		standard				
Ø		34 – 38		39 – 44				

References:

1. Partsch H. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. Phlebology 2008;23(1):40–46.
2. Wolff O et al. The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema. Phlebologie 2011;40(5):245–250.
3. Franks P et al. Management of Patients with Venous Leg Ulcer: Challenges and Current Best Practice. J Wound Care 2016;25 Suppl(6):S1–S67.
4. Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (last access 23.07.2020).

* European Wound Management Association