



Varicex® S

Bi-elastische Zinkleimbinde

Bande à la colle de zinc bi-élastique

Bi-elastic zinc paste bandage

Venda con pasta de zinc elástica a lo largo y ancho

Ligadura bielástica de pasta de óxido de zinco

Benda impregnata di zinco bi-elastica

Bi-elastische zinklijmwachtel

Bi-elastisk zinklimbind

Bielastisk zinklimbinda

Bielastické zinkoklihoové obinadlo

Bielastické zinkoglejové ovinadlo

Bielasztikus cinkenyv pólya

Bandaż bi-elastyczny z pastą cynkową

Bi-elastinen sinkkiliimaside

Varicex® F

Zinkleimbinde

Bande à la colle de zinc

Zinc paste bandage

Venda con pasta de zinc

Ligadura de pasta de óxido de zinco

Benda impregnata di zinco

Zinklijmwachtel

Zinklimbind

Zinklimbinda

Zinkoklihoové obinadlo

Zinkoglejové ovinadlo

Cinkenyv pólya

Bandaż z pastą cynkową

Sinkkiliimaside



Store in dry place under room conditions



Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westertalstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com

4039524/2020-02

de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung und Leistungsmerkmale:
Varicex® S ist eine kurzzügige, bi-elastische Zinkleimbinde. Geeignet für Unna Boot.

Varicex® F ist eine starre Zinkleimbinde. Geeignet für Unna Boot.

Produktzusammensetzung:

Varicex® S: Trägermaterial: 80 % Viskose, 20 % Polyamid - mit Zinkleim beschichtet
Varicex® F: Trägermaterial: 40 % Baumwolle, 60 % Viskose - mit Zinkleim beschichtet
Zinkleim: Zinkoxid, Gelatine, Calciumchlorid, Glycerol, Wasser, Konservierungsmittel (Propyl-4-hydroxybenzoat, Methyl-4-hydroxybenzoat) und Geruchstoffe.

Zweckbestimmung:

Zur Kompression, zum Stützen und Entlasten, zur Ruhigstellung von Körperteilen.

Indikationen:

phlebologische und lymphologische Indikationen: Varikosis, Leitenveninsuffizienz, Thrombophlebitis, Phlebotrombose, postthrombotisches Syndrom, chronische Veneninsuffizienz der Stadien I bis III b (nach Widmer), Ulcus cruris venosum und mixtum, Ödeme (Phleb- und Lipoedeme posttraumatisch, postoperativ, in der Schwangerschaft), nach Sklerosierung und venenchirurgischen Eingriffen.

Kontusionen, Distorsionen, Sehnenverletzungen und Luxationen

Kontraindikationen:

Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheiten, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, Sensibilitätsstörungen der Haut, bekannte Allergien und / oder Überempfindlichkeit gegenüber Produktkomponenten.

Nebenwirkungen:

In sehr seltenen Fällen können Hautirritationen und / oder Allergien auftreten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Unsachgemäßes Bandagieren kann Hautnekrosen und nervale Druckschäden zur Folge haben.
- Eine leichte Blaufärbung der Zehen ist normal, diese muss verschwinden sobald der Patient zu gehen beginnt. Verschwinden die Symptome nicht (Schmerz und Blaufärbung), muss der Verband entfernt und ein weiteres Mal, mit geringerer Kompression, angelegt werden.
- Bei stark zunehmenden Schmerzen während des Tragens muss der Patient den Arzt verständigen.
- Anwendbar bei einem ABPI über 0,8. Bei einem ABPI von 0,5 bis 0,8 nur unter ärztlicher Kontrolle anwenden.
- Bekannte Allergie und / oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten.

Anwendungshinweise:

1. Vorbereitung:
 - Vor dem Anlegen des Verbandes ist eine vorhandene Wunde zu reinigen / debridieren und entsprechend dem Wundstatus mit einem Wundverband abzudecken.
 - Gegebenenfalls druckgefährdete Bereiche polstern.
 - Es wird empfohlen, den Verband morgens vor dem Aufstehen oder nach längerer Hochlagerung des Beines anzulegen und den Patienten anschließend zu Gehübungen aufzufordern.
 - Die Bindebreite sollte dem Durchmesser des zu verbindenden Körperteils entsprechen.
2. Anwendung:
 - Varicex® kann mit Hilfe unterschiedlicher Techniken angelegt werden. Die Wickeltechnik erfolgt in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt.
 - Um eine maximale Gelenkbewegung zu erlangen wird empfohlen, den Verband am rechtwinklig (90°) angewinkelten Bein anzulegen.
 - Verband so anlegen, dass keine Lücken entstehen.
 - Der aufgerollte Teil der Binde (Bindenkopf) zeigt nach außen. Der Bindenkopf ist eng am Bein / Arm zu führen.
 - Bei Lockerung des Verbandes ist der Verband zu erneuern.

Varicex® S lässt sich aufgrund der Bi-Elastizität ohne mehrfaches Ein- und Abschneiden anmodellieren (Abb. 1-6). Der Verband passt sich faltenlos dem Bein an.

Varicex® F – um Lücken im Verband zu vermeiden ggf. die Binde abschneiden und eine neue Tour beginnen (Abb. 10 und 11).

Nach dem Anlegen sollte der Zinkleimverband mit einem tg® Schlauch oder einer Fixierbinde geschützt werden (Abb. 9-11).

Entsorgung:

Das Produkt ist als gefährlicher Abfall zu entsorgen, da es Zinkoxid enthält, welches als chronisch gewässergefährdend eingestuft ist. Der Verwerder hat die jeweils gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten. Nicht verschmutzte Verpackungsfälle können in Europa einem Abfallschlüssel aus Kapitel 15 01 der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung – AVV) zugeordnet werden. Recyclingfähige Verpackungen sollten den jeweiligen nationalen Recyclingsystemen zugeführt werden.

Hinweis:

Enthält Zinkoxid, Freisetzung in die Umwelt vermeiden (giftig für Wasserorganismen, chronisch gewässergefährdend), bitte beachten Sie die besonderen Angaben in Abschnitt Entsorgung

Allgemeine Hinweise:

Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.



Medizinprodukt

fr Mode d'emploi

Description du produit et caractéristiques de performance :
Varicex® S est une bande à la colle de zinc à allongement court, bi-élastique. Convient pour la botte d'Unna.

Varicex® F est une bande rigide à la colle de zinc. Convient pour la botte d'Unna.

Composition du produit :

Varicex® S : Matériel de support : 80 % coton, 20 % polyamide, recouvert de colle de zinc
Varicex® F : Matériel de support : 40 % coton, 60% viscosse, recouvert de colle de zinc
Colle de zinc : Oxyde de zinc, gélatine, chlorure de calcium, glycérol, eau, conservateur (4-hydroxybenzoate de propyle, 4-hydroxybenzoate de méthyle) et agents odorants.

Utilisation prévue :

Compression, soutien et soulagement, ainsi qu'immobilisation de membres.

Indications :

Indications en phlébologie et en lymphologie : varices, insuffisance au niveau des veines profondes, thrombophlébite, phlébotrombose, syndrome post-thrombotique, insuffisance veineuse chronique de stades I à III b (selon la classification de Widmer), ulcus cruris venosum et mixtum, œdèmes (phléboédèmes, lymphœdèmes et lipoédèmes post-traumatiques, post-opérateurs, pendant la grossesse), après une sclérose et après des interventions chirurgicales veineuses.

Contusions, distorsions, lésions tendineuses et luxations.

Contre-indications :

artériopathies oblitérantes périphériques avancées, insuffisance cardiaque décompensée, phlébite septique, phlegmatia coerulea dolens, troubles sensoriels cutanés, allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit.

Effets indésirables :

Des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent survenir dans de très rares cas.

Mise en garde et mesures de précaution :

- Un bandage inadéquat peut entraîner des nécroses cutanées et des lésions nerveuses causées par la pression.
- Une légère coloration bleuâtre des orteils est normale ; elle doit disparaître dès que le patient commence à marcher. Si les symptômes (douleur et coloration bleuâtre) persistent, alors le bandage doit être retiré et posé à nouveau avec une compression moins forte.
- Le patient doit informer le médecin en cas de douleurs fortement croissantes pendant le port.
- Peut être utilisé pour un IPS supérieur à 0,8. En cas d'IPS compris entre 0,5 et 0,8, utiliser exclusivement sous surveillance médicale.
- Allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit.

Conseils d'utilisation :

1. Préparation :
 - Avant l'application du bandage, toute plaie existante doit être nettoyée/débridée et recouverte d'un pansement adapté à l'état de la plaie.
 - Rembourrer le cas échéant les zones à risque de pression.
 - Il est recommandé d'appliquer le bandage le matin avant le lever ou après une période prolongée de position surélevée de la jambe, puis d'inviter le patient à procéder à des exercices de marche.
- La largeur de la bande doit correspondre au diamètre du membre à traiter.

2. Application :

- Varicex® peut être posée à l'aide de différentes techniques. La technique d'enroulement est définie en accord avec le médecin traitant.
- Pour obtenir un mouvement maximal de l'articulation, il est recommandé de poser le bandage sur un pied positionné à angle droit (90°).
- Positionner le bandage de sorte qu'il n'y ait aucun vide.
- La partie enroulée de la bande (extrémité avant de la bande) doit être orientée vers l'extérieur. Serrer étroitement l'extrémité avant de la bande sur la jambe/le bras.
- Si le bandage se desserre, il convient de le remplacer.

Varicex® S peut être modelée sans coupe et découpe multiples selon le type de sa bi-élasticité (Ill. 1 à 6). Le bandage s'adapte à la jambe sans pli.

Varicex® F – pour prévenir les vides du pansement, couper si nécessaire la bande et commencer un nouveau tour (Ill. 10 et 11).

Après la pose, la bande à la colle de zinc doit être protégée à l'aide d'un bandage tubulaire tg® ou d'une bande de fixation (Ill. 9 à 11).

Élimination :

Le produit doit être éliminé avec les déchets dangereux étant donné qu'il contient de l'oxyde de zinc considéré comme danger (toxique pour les organismes aquatiques, danger chronique pour le milieu aquatique). L'utilisateur doit respecter les lois, normes et directives applicables à l'élimination des déchets issus du secteur médical. En Europe, un code de déchet du Chapitre 15 01 de la Directive du catalogue européen des déchets (catalogue européen des déchets – CED, AVV en Allemagne) peut être affecté aux déchets d'emballage non souillés. Les emballages recyclables doivent être déposés dans les systèmes de recyclage nationaux correspondants.

Remarque :

Contient de l'oxyde de zinc, éviter tout rejet dans l'environnement (toxique pour les organismes aquatiques, danger chronique pour le milieu aquatique), veuillez respecter les instructions spécifiques au paragraphe Élimination.

Remarques générales :

En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité sanitaire compétente.



Dispositif médical

en Instructions for use

Product description and performance characteristics:
Varicex® S is a short-stretch, bi-elastic zinc paste bandage. Suitable for an Unna boot.

Varicex® F is a rigid zinc past bandage. Suitable for an Unna boot.

Product composition:

Varicex® S: backing material: 80% viscose, 20% polyamide - with zinc paste coating
Varicex® F: backing material: 40% cotton, 60% viscose - with zinc paste coating
Zinc paste: zinc oxide, gelatine, calcium chloride, glycerol, water, preservatives (propyl 4-hydroxybenzoate, methyl 4-hydroxybenzoate) and fragrance.

Intended purpose:

For compression, support and relief, for immobilisation of limbs.

Indications:

Phlebotic and lymphological indications: varicosis, deep venous insufficiency, thrombophlebitis, phlebotrombosis, post-thrombotic syndrome, Widmer's stage I to III b chronic venous insufficiency, venous and mixed ulcers, oedema (phleboedema, lymphoedema, lipoedema, post-traumatic, post-operative, during pregnancy), after sclerotherapy and venous surgery.

Contusions, sprains, tendon injuries and joint dislocations.

Contraindications:

Advanced peripheral arterial occlusive diseases, congestive heart failure, septic phlebitis, phlegmasia cerulea dolens, sensation disorders of the skin, known allergies and/or hypersensitivity to any of the product components.

Side effects:

In very rare cases, skin irritations and/or allergies may occur.

Warnings and precautions:

- Incorrect bandaging can result in skin necrosis and pressure damage to nerves.
- Slight bluish tinge to the toes is normal, this should disappear as soon as the patient starts to walk. If the symptoms do not disappear (pain and bluish tinge), the bandage must be removed and applied again with less compression.
- The patient must inform their doctor if sharply increasing pain occurs while wearing the bandage.
- For use with ABPIs over 0.8. When the ABPI is between 0.5 and 0.8, apply under medical supervision only.
- Known allergy and/or hypersensitivity to any of the product components.

Usage information:

1. Preparation:
 - Before applying the bandage, clean / debride any wound that is present and cover with a wound dressing appropriate for the wound status.
 - If necessary, apply padding to areas at risk of developing pressure ulcers.
 - It is recommended to apply the bandage in the morning before the patient gets up or after the patient has rested the leg in a raised position for a prolonged period and to then encourage the patient to walk.
 - The width of the bandage should correspond to the diameter of the limb to be banded.
2. Usage:
 - Varicex® can be applied using a variety of techniques. The bandaging technique is chosen in consultation with the treating physician.
 - To achieve maximum joint movement, it is recommended to apply the bandage with the foot at an angle of 90° to the leg.
 - Apply the bandage so that there are no gaps.
 - The bandage is unrolled with the rolled-up portion (roll) on top. Keep the roll close to the leg / arm.
 - The bandage must be replaced when it becomes loose.

Due to its bi-elasticity, Varicex® S can be moulded to the body without making multiple clips or cuts (Fig. 1-6). The bandage conforms to the leg without creases.

Varicex® F – if necessary to prevent gaps in the dressing, cut off the bandage and then start wrapping it again (Fig. 10 and 11).

After it has been applied, the zinc paste bandage should be protected by a tg® Tubular Bandage or a conforming bandage (Fig. 9-11).

Disposal:

The product must be disposed of as hazardous waste, since it contains zinc oxide, which is classified as chronically hazardous to the aquatic environment. The user must observe the respective laws, standards and guidelines on disposal of waste from the medical sector. In Europe, non-contaminated packaging waste can be assigned a waste code from Chapter 15 01 of the Directive on the European Waste Catalogue (Waste Catalogue Ordinance – AVV). Packaging labelled as recyclable should be taken into the respective national recycling systems.

Note:

Contains zinc oxide, avoid release into the environment (poisonous for water organisms, chronically hazardous to the aquatic environment), please take note of the special information in the "Disposal" section.

General instructions:

In case of a serious incident, contact the manufacturer and the responsible health authorities.



Medical Device

es Instrucciones de uso

Descripción del producto y características:

Varicex® S es una venda con pasta de zinc elástica a lo largo y ancho de tracción corta. Apta para Unna Boot.

Varicex® F es una venda rígida con pasta de zinc. Apta para Unna Boot.

Composición del producto:

Varicex® S: Textil de respaldo: 80 % viscosa, 20 % poliamida; recubierta con pasta de zinc
Varicex® F: Textil de respaldo: 40 % algodón, 60 % viscosa; recubierta con pasta de zinc
Pasta de zinc: óxido de zinc, gelatina, cloruro cálcico, glicerol, agua, conservantes (propil-4-hidroxibenzoato, metil-4-hidroxibenzoato) y aromatizantes.

Finalidad prevista:

Para la compresión, como apoyo y descarga, para la inmovilización de los miembros.

Indicaciones:

Indicaciones flebológicas y linfológicas: Varices, insuficiencia de las venas conductoras, tromboflebitis, flebotrombosis, síndrome postrombótico, insuficiencia venosa crónica de estadio I a III b (enfermedad de Widmer), úlceras venosas y mixtas, edemas (fleboedemas, edemas linfáticos y lipoedemas postoperatorios, postraumáticos y durante el embarazo), después de una esclerosis y tras operaciones de cirugía venosa.

Contusiones, distorsiones, lesiones de tendones y luxaciones.

Contraindicaciones:

Enfermedades arteriales obstructivas periféricas avanzadas, insuficiencia cardíaca descompensada, flebitis séptica, flegmasia cerúlea dolorosa, trastornos de sensibilidad de la piel, alergias conocidas y/o hipersensibilidad a los componentes del producto.

Efectos adversos:

En muy raros casos pueden presentarse irritaciones cutáneas y/o alergias.

Advertencias y medidas de precaución:

- Una vendaje inadecuado puede causar necrosis cutáneas y daños nerviosos debidos a una presión excesiva.
- Una ligera coloración azul de los dedos es normal; esta debe desaparecer en cuanto el paciente comienza a andar. Si los síntomas no desaparecen (dolor y coloración azul), la venda debe retirarse y volver a aplicarse otra vez, pero con una compresión más reducida.
- En caso de sentir fuertes dolores que van en aumento mientras lleva puesta la venda, el paciente debe avisar a su médico.
- Puede llevarse con un índice tobillo-brazo de más de 0,8. Con un índice tobillo-brazo de 0,5 a 0,8, utilizar únicamente bajo control médico.
- Alergia y/o hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto.

Modo de aplicación:

1. Preparación:
 - Antes de aplicar la venda, la posible herida debe ser limpiada/desbridada y cubierta con un apósito conforme al estado de la herida.
 - En caso necesario, acolche las zonas con peligro de presión.
 - Se recomienda aplicar la venda por las mañanas antes de levantarse o después de haber tenido la pierna levantada durante bastante tiempo y, después, instar al paciente a que realice ejercicios de movilidad.
 - El ancho de la venda debe estar directamente relacionado con el diámetro del miembro a tratar.
2. Aplicación:
 - Varicex® puede aplicarse con ayuda de diferentes técnicas. Pida a su médico que le aconseje sobre la técnica de aplicación.
 - Con el fin de conseguir el máximo movimiento de la articulación, se recomienda aplicar la venda sobre el pie, que debe estar en posición de 90° con respecto a la pierna
 - Aplique la venda de modo que no queden huecos.
 - La parte desenrollada de la venda (el extremo de la venda) apunta hacia fuera. El extremo de la venda debe conducirse de forma ceñida por la pierna/el brazo.
 - Si la venda se afloja, debe cambiarse por una nueva.

Como es elástica a lo largo y ancho, Varicex® S puede modelarse sin recortarla varias veces (figura 1-6). El vendaje se adapta sin arrugas a la pierna.

Varicex® F: para evitar huecos en el vendaje, recorte en su caso la venda y comience una nueva vuelta (figuras 10 y 11).

Tras la aplicación, la venda con pasta de zinc debe protegerse con una venda tubular tg® o una venda de fijación (figura 9-11).

Eliminación:

El producto debe eliminarse como residuo peligroso, pues contiene óxido de zinc, que está clasificado como contaminante crónico del agua. El usuario debe observar las leyes, normativas y directivas vigentes en materia de eliminación de residuos del sector médico. En Europa, los residuos de embalaje no contaminados pueden recibir un código de residuo conforme al capítulo 15 01 de la Directiva sobre la lista de residuos europea (Reglamento sobre la lista de residuos, AVV). Los envases reciclables deben enviarse a los sistemas nacionales de reciclado adecuados.

Advertencia:

Contiene óxido de zinc; evite la liberación al medio ambiente (tóxico para los organismos acuáticos, contaminante crónico del agua); observe las indicaciones especiales incluidas en el apartado «Eliminación».

Indicaciones generales:

En el caso de un incidente grave, contacte con el fabricante y las autoridades sanitarias responsables.



Dispositivo médico

pt Instruções de utilização

Descrição e características do produto:

Varicex® S é uma ligadura bielástica de pasta de óxido de zinco de baixa elasticidade. É adequada para Bota de Unna.

Varicex® F é uma ligadura rígida de pasta de óxido de zinco. É adequada para Bota de Unna.

Composição do produto:

Varicex® S: material de suporte: 80 % viscosse, 20 % poliamida - revestido com pasta de óxido de zinco
Varicex® F: material de suporte: 40 % algodão, 60 % viscosse - revestido com pasta de óxido de zinco
Pasta de óxido de zinco: óxido de zinco, gelatina, cloroeto de cálcio, glicérol, água, conservantes (4-hidroxibenzoato de propilo, 4-hidroxibenzoato de metilo) e substâncias odoríferas.

Finalidade:

Para compressão, apoio e alívio, para imobilização de partes do corpo.

Indicações:

indicações flebológicas e linfológicas: Varicose, insuficiência venosa, tromboflebite, flebotrombose, síndrome pós-trombótica, insuficiência venosa crônica dos estágios I a III b (doença de Widmer), úlceras venosas de perna e úlceras mistas, edemas (fleboedema, linfoedema, lipoedema, pós-traumático, pós-operatório, durante a gravidez), após esclerose e intervenções cirúrgicas venosas.

Contusões, entorses, lesões tendíneas e luxações.

Contraindicações:

Doenças arteriais oclusivas periféricas avançadas, insuficiência cardíaca descompensada, flebite séptica, flegmasia coerulea dolens, distúrbios da sensibilidade cutânea, alergias e/ou hipersensibilidade conhecidas a componentes do produto.

Efeitos secundários:

Em casos muito raros podem surgir irritações cutâneas e/ou alergias.

Advertências e precauções:

- A colocação inadequada da ligadura pode resultar em necrose da pele e danos por pressão nos nervos.
- Uma leve coloração azul dos dedos dos pés é normal, esta deve desaparecer assim que o paciente começa a andar. Se os sintomas não desaparecerem (dor e coloração azul), a ligadura deve ser retirada e aplicada novamente com menos compressão.
- O paciente deverá informar o médico, se a dor aumentar fortemente durante o uso da ligadura.
- Aplicável para um ABPI acima de 0,8. Para um ABPI entre 0,5 e 0,8, use somente sob supervisão médica.
- Alergia e/ou hipersensibilidade conhecida a um dos componentes do produto.

Instruções de aplicação:

1. Preparação:
 - Antes de aplicar a ligadura, uma ferida existente deve ser limpa/desbridada e coberta com um penso de acordo com o estado da ferida.
 - Se necessário, estofe as áreas em risco de pressão.
 - Recomenda-se aplicar a ligadura pela manhã, antes de levantar, ou após uma elevação mais longa da perna e depois pedir ao paciente para fazer exercícios de caminhada.
 - A largura da ligadura deve corresponder ao diâmetro da parte do corpo a ser ligada.
2. Aplicação:
 - Varicex® pode ser aplicada através de várias técnicas. A técnica de enrolamento é acordada com o profissional de saúde.
 - Para obter um máximo movimento articular, recomenda-se começar a aplicar a ligadura num pé posicionado num ângulo reto (90°).
 - Aplique a ligadura de tal forma que não existam espaços vazios.
 - A parte enrolada da ligadura (cabeca da ligadura) aponta para fora. A cabeça da ligadura deve ser mantida perto da perna/braço.
 - Se a ligadura se tornar solta, esta deve ser renovada.

Devido a sua elasticidade, Varicex® S pode ser modelado sem cortes múltiplos (Fig. 1-6). A ligadura adapta-se à perna sem pregas.

Varicex® F – para evitar espaços vazios na ligadura, se necessário, corte a ligadura e inicie uma nova volta (Fig. 10 e 11).

Depois de aplicada, a ligadura de pasta de óxido de zinco deve ser protegida com um tubo tg® ou com uma ligadura de fixação (Fig. 9-11).

Eliminação:

O produto deve ser eliminado como residuo perigoso, pois contém óxido de zinco que é classificado como um poluente crónico de água. O utilizador deve cumprir as leis, normas e diretivas aplicáveis para a eliminação dos resíduos médicos. Na Europa, aos resíduos de embalagens não poluídas pode ser atribuído o código do Capítulo 15 01 da Diretiva relativa à Lista Europeia de Resíduos (Código LER). As embalagens recicláveis devem ser eliminadas nos respetivos sistemas nacionais de reciclagem.

Instrução:

nl Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving en prestatiekenmerken:

Varicex® S is een bi-elastische korterekt zinklijmzwachtel. Geschikt voor Unna-boot.

Varicex® F is een rigide zinklijmzwachtel. Geschikt voor Unna-boot.

Productsamenstelling:

Varicex® S: Steunlaagmateriaal: 80% viscose, 20% polyamide - met een laagje zinklijm
Varicex® F: Steunlaagmateriaal: 40% katoen, 60% viscose - met een laagje zinklijm
Zinklijm: zinkoxide, gelatine, calciumchloride, glycerol, water, conserveringsmiddel (propyl-4-hydroxybenzoaat, methyl-4-hydroxybenzoaat) en geurstoffen.

Beoogd gebruik:

Voor compressie, voor het ondersteunen en ontlasten, en voor het immobiliseren van lichaamsdelen.

Indicates:

Flebologische en lymfatische indicaties: spataderen, diepveneuze insufficiëntie, tromboflebitis, flebotrombose, posttrombotisch syndroom, chronische veneuze insufficiëntie graad I tot III b (volgens Widmer), ulcus cruris venosum en mixtum, oedeem (flegmisch oedeem, lymf- en lipodeem, posttraumatisch, postoperatief, tijdens de zwangerschap), na scleroserende therapie en na vaatchirurgische ingrepen.
Contusies, distorsies, peesletsels en luxaties.

Contra-indicates:

Gevoerde perifere arteriële occlusieve vaatziektes, gecompenseerde hartinsufficiëntie, septische flebitis, flegmasia coerulea dolens, sensibiltiteitsstoornissen van de huid, bekende allergieën en/of overgevoeligheid voor de productcomponenten.

Bijwerkingen:

In zeer zeldzame gevallen kunnen huidirritaties en/of allergieën optreden.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- Ondeskundig aangebrachte zwachtels kunnen necrose van de huid en drukletsels van zenuwen tot gevolg hebben.
- Een lichte blauwverkleuring van de tenen is normaal, dit moet verdwijnen zodra de patiënt begint te lopen. Als de symptomen (pijn, blauwverkleuring) niet verdwijnen, moet het verband worden verwijderd en opnieuw, met minder compressie, worden aangelegd.
- Bij ernstige toemengende pijn tijdens het dragen moet de patiënt de arts raadplegen.
- Kan worden gebruikt bij een ABPI van meer dan 0,8. Bij een ABPI van 0,5 tot 0,8 uitsluitend onder toezicht van een arts gebruiken.
- Bekende allergie en/of overgevoeligheid voor het product of bestanddelen daarvan.

Gebruiksaanstructies:

- Voorbereiding:
 - Voordat de zwachtel wordt aangelegd, moet een aanwezige wond worden gereinigd/gebedreideerd en zoals voor de toestand van de wond noodzakelijk is met een wondverband worden afgedekt.
 - Polster gebieden met een drukrisico indien nodig.
 - Het wordt aanbevolen het verband aan te leggen 's morgens vóór het optstaan of na een langere periode dat het been omhoog heeft gelegen, en de patiënt aansluitend te stimuleren loopeffeningen te gaan doen.
 - De breedte van de zwachtel moet passen bij de diameter van het te verbinden lichaamsdeel.

- Toepassing:
 - Varicex® kan met behulp van diverse technieken worden aangelegd. De wikkeltechniek wordt bepaald in samenspraak met de behandelend arts.
 - Om een maximale bewegingsuitslag van het gewricht mogelijk te maken, wordt aanbevolen de zwachtel aan te leggen met het gewricht in een hoek van 90°.
 - Leg het verband zodanig aan dat er geen hiaten ontstaan.
 - Het opgerolde deel van de zwachtel (verbandrol) wijst naar buiten. De verbandrol moet nauw tegen het been of de arm worden geleid.
 - Als het verband losser gaat zitten, moet het verband worden verwisseld.

Varicex® S kan door de bi-elasticiteit zonder meermalen in- en afknippen worden gemodelleerd (Afb. 1-6). Het verband past zich zonder ploeien aan het been aan.

Varicex® F – om hiaten in het verband te vermijden, kunt u het verband indien nodig afknippen en beginnen met een nieuwe toer (Afb. 10 en 11).

Na het aanleggen moet het zinklijmverband met een tg®-buisverband of een fixatiezwachtel worden beschermd (Afb. 9-11).

Weggooiën:

Dit product moet worden weggegooid als gevaarlijk afval omdat het zinkoxide bevat dat een chemisch gevaarlijk in water wordt beschouwd.

De gebruiker dient zich te houden aan de geldende wetten, normen en richtlijnen voor het weggooiën van medisch afval. In Europa kan niet-vervuld verpakkingsafval worden toegewezen aan een afvalcode uit hoofdstuk 15 01 van de Richtlijn over de Europese Afvalcatalogus (Afvalcatalogusbesluit – AVV). Verpakkingen die geschikt zijn voor hergebruik, moeten naar de betreffende nationale recyclesystemen worden gebracht.

Opmerking:

Bevat zinkoxide, vrijkomen in het milieu vermijden (giftig voor waterorganismen, chronisch gevaarlijk in water). De bijzondere instructies in het gedeelte "Weggooiën" moeten in acht genomen worden.

Algemene aanwijzingen:

In geval van een ernstig incident neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

MD

Medisch hulpmiddel

da Brugsanvisning

Produktbeskrivelse og egenskaber:

Varicex® S er et kort, bi-elastisk zinklimbind. Velegnet til unna boot.

Varicex® F er et stift zinklimbind. Velegnet til unna boot.

Produktsammensætning:

Varicex® S: Bærematerial: 80 % viskose, 20 % polyamid - belagt med zinklim
Varicex® F: Bærematerial: 40 % bomuld, 60 % viskose - belagt med zinklim
Zinklim: Zinkoxid, gelatine, calciumklorid, glycerol, vand, konserveringsmiddel (propyl-4-hydroxybenzoate, methyl-4-hydroxybenzoate) og duftstoffer.

Tilsligt anvendelse:

Til kompression, støtte og aflastning og til immobilisering af kropsdele.

Indikationer:

flebologiske og lymfologiske indikationer: Varikose, dyb venøs insufficiens, tromboflebitis, flebotrombose, posttrombotisk syndrom, kronisk venøs insufficiens i stadiet I-III b (enligt Widmer), ulcus cruris venosum og mixtum, ødem (fleb-, lymf-, lipødem, posttraumatisk, postoperativt, under graviditet), efter skleroterapi og venekirurgiske indgreb.
Kontusioner, distorsioner, seneskader og luksationer.

Kontraindikationer:

Fremskredne perifere arterielle karsygdomme, dekompenseret hjerteinsufficiens, sepsitisk flebitis, phlegmasia cerula dolens, sensibilitetsforstyrrelser i huden, kendte allergier og / eller overfølsomhed over for produktkomponenter.

Bivirkninger:

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme hudirritationer og/eller allergier.

Advarsler og forholdsregler:

- Ukorrekt bandagering kan medføre hudnekroser og nervale trykskader.
- En let blåfarvning af tærne er normalt; den skal forsvinde, så snart patienten begynder at gå. Hvis symptomerne ikke forsvinder (smerter og blåfarvning), skal forbindningen fjernes og anlægges endnu en gang, med mindre kompression.
- Ved stærkt tiltagende smerter under brugen skal patienten søge læge.
- Kan anvendes ved et ABPI over 0,8. Ved et ABPI på 0,5 til 0,8 må bindet kun anvendes under opsyn af en læge.
- Kendt allergi og / eller overfølsomhed over for en af produktkomponenterne.

Anvendelsesanvisninger:

- Forberedelse:
 - Inden anlægning af forbindningen skal et evt. sår renses/ debrideres og afdækkes med en sårforbinding, der svarer til sårets status.
 - I givet fald skal områder med risiko for tryk polstres.
 - Det anbefales at anlægge forbindningen om morgenen, før patienten står op, eller efter længere tid med benet i løftet position, og opfordre patienten efterfølgende til at gå lidt.
 - Bindbredden skal modsvare diameteren på kropsdelen, der skal forbindes.

- Anvendelse:
 - Varicex® kan anlægges ved hjælp af forskellige teknikker. Forbindningsteknikken aftales med den behandelende læge.
 - For at opnå den bedst mulige ankelbevagelse anbefales det at holde foden i en ret vinkel (90°), når bindet anlægges.
 - Forbindningen skal anlægges, så der ikke opstår huller.
 - Den oprullede del af bindet (bindeknude) peger udad. Knuden på bindet skal føres tæt ved benet/armen.
 - Hvis forbindningen løsner sig, skal den skiftes.

Varicex® S kan på grund af bi-elasticiteten formes, uden at du skal skære og klippe af forbindningen (fig. 1-6). Forbindningen tilpasser sig benet, så den ligger helt glat.
Varicex® F – for at undgå huller kan du i givet fald klippe af bindet og påbegynde en ny omvikling (fig. 10 og 11).

Når bindet er anlagt, skal zinklimforbindingen beskyttes med en tg®-rørforbinding eller et fikseringsbind. (fig. 9-11).

Bortskaffelse:

Produktet skal bortskaffes som farligt affald, da det indeholder stoffer, der er klassificeret som kronisk farligt for vandmiljøet.
Brugeren skal overholde de til enhver tid gældende love, normer og retningslinjer til bortskaffelse af medicinalaffald.
Ike forurenet emballageaffald kan i Europa indrindes under en affaldskode i kapitel 15 01 i Det Europæiske Affaldskatalog (Affaldskatalogbekendtgørelse – EAK). Emballage, der kan genindvendes, skal tilføres et nationalt genindvindingsystem.

Bemærk:

Indeholder zinkoxid, undgå udledning til miljøet (giftigt for vandorganismer, kronisk farligt for vandmiljøet). Du bedes være opmærksom på de særlige oplysninger i afsnittet "Bortskaffelse".

Generelle anvisninger:

Ved forekomst af en alvorlig hændelse bedes du henvende dig til producenten og de ansvarlige sundhedsmyndigheder.

MD

Medicinteknisk produkt

sv Bruksanvisning

Produktbeskrivning och egenskaper:

Varicex® S är en lag- och bi-elastisk zinklimbinda. Soveltu Unna Boot -sitten kanssa käytettäväksi.

Varicex® F on jäykkä sinkkilimmaside. Soveltuu Unna Boot -siteen kanssa käytettäväksi.

Produktsammansättning:

Varicex® S: Bärmaterial: 80 % viskos, 20 % polyamid med zinklim
Varicex® F: Bärmaterial: 40 % bomull, 60 % viskos med zinklim
Zinklim: zinkoxid, gelatin, kalciumklorid, glycerol, vatten, konserveringsmedel (propyl-4-hydroxybenzoat, metyl-4-hydroxybenzoat) och luktnämnen.

Avsedd användning:

För kompression, stöd och avlastning, viloställning av kroppsdelar.

Indikationer:

Flebologiska och lymfologiska indikationer: Varicer, insufficiens i djupa vener, tromboflebit, flebotrombos, posttrombotiskt syndrom, kronisk venös insufficiens i stadium I–III b (enligt Widmer), ulcus cruris venosum och mixtum, ödem (fleb-, lymf-, lipödem, posttraumatiskt, postoperativt, under graviditet), efter sklerosering och venkirurgiska ingrepp.
Kontusioner, distorsioner, seneskador och luxationer.

Kontraindikationer:

Främskriden perifer arteriell okklusion, inkompenserad hjärtsufficiens, sepsitisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, sensibilitetsrubbingar i huden, känd allergi och/eller överkänslighet mot produktkomponenterna.

Biverkningar:

I mycket sällsynta fall kan hudirritation och/eller allergier uppstå.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

- Osakunnig förbandsläggning kan leda till hudnekroser och trykskador på nerver.
- En lätt blåfärgning av tårna är normal. Den måste dock försvinna, när patienten börjar gå. Försvinner inte symptomen (smärta och blåfärgning) måste förbandet tas av och läggas på igen med mindre kompression.
- Vid starkt tiltagande smärta när förbandet bärs måste patienten meddela sin läkare.
- Kan användas vid ett ABPI över 0,8. Vid ett ABPI på 0,5–0,8 får bindan endast användas under läkares överinseende.
- Känd allergi och/eller överkänslighet mot någon av produktens komponenter.

Råd för användningen:

- Forberedelse:
 - Innan förbandet läggs ska eventuella sår rengöras/debrideras och täckas med ett särförband som är lämpligt för sårets status.
 - Polstra eventuellt känsliga områden.
 - Vidan används ett förbandet läggs innan patienten går upp på morgonen eller efter en längre stunds högläge av benet, och att patienten därefter uppmannas till gångövningar.
 - Bindans bredd ska motsvara diametern på kroppsdelen som ska förbindas.

- Användning:
 - Varicex® kan appliceras med olika tekniker. Lindringstekniken stäms av med behandlande läkare.
 - Jo potillaailla ilmene käytön aikana voimakasta kipua, siitä on ilmoitettava lääkärille.
 - Voidaan käyttää, kun ABPI on yli 0,8. Jos ABPI on 0,5–0,8, sidettä saa käyttää vain lääkärin valvonnassa.
 - Tiedossa oleva allergia ja/tai yliherkkyys jollekin tuotekomponentille.

- Käyttö:
 - Varicex®-siten asettamiseen voidaan käyttää erilaisia tekniikoita. Käärintekniikka päätetään hoitavan lääkärin kanssa.
 - Jotta varmistetaan asettettavaksi aamuisin ennen sängystä nousemistai tai jalan pidemmän kohoasennossa pitämisen jälkeen. Tämän jälkeen potilasta on pyydettävä tekemään kävelyharjoituksia.
 - Sidontaleveyden pitää vastata sidottavan kehonosan läpimittaa.

- Käyttö:
 - Varicex®-siten asettamiseen voidaan käyttää erilaisia tekniikoita. Käärintekniikka päätetään hoitavan lääkärin kanssa.
 - Jotta varmistetaan asettettavaksi aamuisin ennen sängystä nousemistai tai jalan pidemmän kohoasennossa pitämisen jälkeen. Tämän jälkeen potilasta on pyydettävä tekemään kävelyharjoituksia.
 - Sidontaleveyden pitää vastata sidottavan kehonosan läpimittaa.

- Käyttö:
 - Varicex®-siten asettamiseen voidaan käyttää erilaisia tekniikoita. Käärintekniikka päätetään hoitavan lääkärin kanssa.
 - Jotta varmistetaan asettettavaksi aamuisin ennen sängystä nousemistai tai jalan pidemmän kohoasennossa pitämisen jälkeen. Tämän jälkeen potilasta on pyydettävä tekemään kävelyharjoituksia.
 - Sidontaleveyden pitää vastata sidottavan kehonosan läpimittaa.

Varicex® S passar tack vare bielasticiteten utan att klippas till (bild 1–6). Förbandet anpassar sig till benet utan att veckas.

Varicex® F – för att förhindra luckor i förbandet klipper du vid behov av bindan och påbörjar en ny lindning (bild 10 och 11).

Efter appliceringen ska zinklimförbandet skyddas med en tg®-slang eller fixeringsbinda (bild 9–11).

Kassering:

Produkten ska kasseras som farligt avfall eftersom den innehåller zinkoxid, vilket är klassificerat som kroniskt toxiskt för vattenorganismer.

Användaren ska följa gällande lagar, regler och riktlinjer för kassering av avfall från det medicinska området. Icke nedsmutsat förpackningsavfall kan tilldelas en avfallskod från kapitel 15 01 i direktivet om Europeiska avfallskatalogen (avfallskatalogförordningen). Förpackningar som kan återvinnas ska kasseras enligt de nationella återvinningssystemen.

Hävtättningsanvisning:

Tuote on hävettävässä vaarallisena jätteenä, koska se sisältää sinkkioksidia, joka luokitellaan pysyvästi vesistöille haitalliseksi. Käyttäjän on lääkinnällisiä jätteitä hävittäessään aina noudatettava voimassa olevia lakeja, standardeja ja direktiivejä. Likaantumatottomat pakkausjätteet voidaan Euroopassa luokitella eurooppalaisen jäteluetteloasetuksen luvun 15 01 jätteenämen mukaisesti. Käritettävää tuotepakkaukset tulee lajitella paikallisten kierrätyskäärysten mukaisesti.

Allmänna anvisningar:

Om en allvarig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga hälsomyndigheter.

MD

Medicinteknisk produkt

fi Käyttöohje

Tuotekuvaus ja ominaisuudet:

Varicex® S on lyhytkuituinen, bi-elastinen sinkkilimmaside. Soveltuu Unna Boot -siteen kanssa käytettäväksi.

Varicex® F on jäykkä sinkkilimmaside. Soveltuu Unna Boot -siteen kanssa käytettäväksi.

Tuotteen koostumus:

Varicex® S: Tukimateriaali: 80 % viskoosia, 20 % polyamidia – sinkkilimapiinnoite
Varicex® F: Tukimateriaali: 40 % puuvillaa, 60 % viskoosia – sinkkilimapiinnoite
Zinkkoin kili: Oxiid zincatit, želatina, klorid väpenäty, glycerol, vesi, säilöntäaine (propyyli-4-hydroksibentsoatti, metyyli-4-hydroksibentsoatti) ja hajusteet.

Käyttötärkautius:

Kompressioon, tukemiseen ja paineen keventämiseen sekä kehonosien rauhoittamiseen.

Indikaatiot:

flebologiset ja lymfologiset indikaatiot: suonikohjut, syvien laskimoiden vajaatoiminta, tromboflebiitti, flebotromboosi, posttrombootinen oireyhtymä, krooninen laskimoiden tason I–III b vajaatoiminta (Widmerin mukaan), jalan laskimotukos ja valtimo-laskimotukos, edeema (posttraumaattinen fleboedeema, lymfoedeema ja lipodeema, postoperatiiviseti, raskausaikana), sklerosis ja laskimokirurgian jälkeen. kontusiot, nyrjähdykset, jännevammat ja luksaatio.

Kontraindikaatiot:

pitkälle edenneet ääreisvaltimoiden tukkeumasairaudet, dekompensoitunut sydämen vajaatoiminta, septinen laskimotulehdus, syväin laskimotromboosin akutti fulminantti muoto, ihon herkkyyshäiriöt, tunnetut allergiat ja/tai yliherkkyydet tuotteen ainesosille.

Sivuvaikutukset:

Hyvin harvinaisissa tapauksissa saattaa ilmetä ihoärsytystä ja/tai allergioita.

Varoitukset ja varoitoimenpiteet:

- Epäasianmukainen sidonta voi aiheuttaa ihonekroosin ja hermostollisia paineavaroita.
- Varpaiden lievä sinertyminen on normaalia, ja sen pitäisi häviätä hitai, kun potilas alkaa kävellä. Jos oireet eivät häviä (kipu ja sinerys), side on poistettava ja sidottava uudelleen niin, ettei se purista yhtä paljon.
- Jo potilaalla ilmenee käytön aikana voimakasta kipua, siitä on ilmoitettava lääkärille.
- Voidaan käyttää, kun ABPI on yli 0,8. Jos ABPI on 0,5–0,8, sidettä saa käyttää vain lääkärin valvonnassa.
- Tiedossa oleva allergia ja/tai yliherkkyys jollekin tuotekomponentille.

Käyttöohjeet:

- Valmistelu:
 - Haava on ennen siten asettamista puhdistettava ja haavan tilan mukaan tarvittaessa peitettävä haavasiteellä.
 - Puristumissa vaarassa olevat alueet on tarvittaessa pehmustettava.
 - Side suositellaan asettettavaksi aamuisin ennen sängystä nousemistai tai jalan pidemmän kohoasennossa pitämisen jälkeen. Tämän jälkeen potilasta on pyydetttävä tekemään kävelyharjoituksia.
 - Sidontaleveyden pitää vastata sidottavan kehonosan läpimittaa.

- Käyttö:
 - Varicex®-siten asettamiseen voidaan käyttää erilaisia tekniikoita. Käärintekniikka päätetään hoitavan lääkärin kanssa.
 - Jotta varmistetaan asettettavaksi aamuisin ennen sängystä nousemistai tai jalan pidemmän kohoasennossa pitämisen jälkeen. Tämän jälkeen potilasta on pyydetttävä tekemään kävelyharjoituksia.
 - Sidontaleveyden pitää vastata sidottavan kehonosan läpimittaa.

Varicex® S passar tack vare bielasticiteten utan att klippas till (bild 1–6). Förbandet anpassar sig till benet utan att veckas.

Varicex® F – för att förhindra luckor i förbandet klipper du vid behov av bindan och påbörjar en ny lindning (bild 10 och 11).

Efter appliceringen ska zinklimförbandet skyddas med en tg®-slang eller fixeringsbinda (bild 9–11).

Kassering:

Produkten ska kasseras som farligt avfall eftersom den innehåller zinkoxid, vilket är klassificerat som kroniskt toxiskt för vattenorganismer.

Användaren ska följa gällande lagar, regler och riktlinjer för kassering av avfall från det medicinska området. Icke nedsmutsat förpackningsavfall kan tilldelas en avfallskod från kapitel 15 01 i direktivet om Europeiska avfallskatalogen (avfallskatalogförordningen). Förpackningar som kan återvinnas ska kasseras enligt de nationella återvinningssystemen.

Hävtättningsanvisning:

Tuote on hävettävässä vaarallisena jätteenä, koska se sisältää sinkkioksidia, joka luokitellaan pysyvästi vesistöille haitalliseksi. Käyttäjän on lääkinnällisiä jätteitä hävittäessään aina noudatettava voimassa olevia lakeja, standardeja ja direktiivejä. Likaantumatottomat pakkausjätteet voidaan Euroopassa luokitella eurooppalaisen jäteluetteloasetuksen luvun 15 01 jätteenämen mukaisesti. Käritettävää tuotepakkaukset tulee lajitella paikallisten kierrätyskäärysten mukaisesti.

Allmänna anvisningar:

Om en allvarig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga hälsomyndigheter.

cs Návod k použití

Popis výrobku a charakteristika:

Varicex® S je bi-elastické zinkoklňové obinadlo s krátkým tahem. Vhodné pro Unna Boot.

Varicex® F je tuhé zinkoklňové obinadlo. Vhodné pro Unna Boot.

Složení výrobku:

Varicex® S: Nosný materiál: 80 % viskóza, 20 % polyamid – potiahnutý zinkovým glejom
Varicex® F: Nosný materiál: 40 % bavlna, 60 % viskóza – potiahnutý zinkovým glejom
Zinkový kľi: Oxid zinečnatý, želatina, chlorid vápenatý, glycerol, voda, konzervační prostriedek (propyl-4-hydroxybenzoát, metyl-4-hydroxybenzoát) a vonné látky.

Účel použiti:

Ke kompresi, opoře a odlehčení, k znehybnění části těla.

Indikace:

Flebologické a lymfologické indikace: varikóza, insuficience hlbokých žil, tromboflebitida, flebotrombóza, posttrombotický syndrom, chronická žilní insuficience stádia I až III b (podľa Widmera), ulcus cruris venosum a mixtum, edémy (flebedémy, flebotrombóza, lipedémy posttraumatické, pooperačné, v tehotenstve), po sklerotizácii a chirurgických zákrokoch na žilách. Kontuze, distorzie, poranění šlach a luxácie.

Kontraindikace:

Pokročilé periférne arteriálne onemocnění, dekompenzovaná nedostatočnosť srdčnej, septická flebitida, phlegmasia coerulea dolens, poruchy citlivosti kože, známe alergie a/alebo precitlivosť voči zložkám výrobku.

Vedlejší účinky:

Velmi zřídka může dojít k podráždění kůže a/nebo alergiím.

Výstražné pokyny a preventivní opatření:

- Nesprávné provedení bandáže může způsobit nekrózu kůže a tlakové poškození nervů.
- Namodré zbarvení prstů je normální, ztratí se, jakmile pacient začne chodit. Pokud příznaky nezmizí (bolest a namodralé zbarvení), obvaz se musí odstranit a znovu přiložit s menší kompresí.
- V případě silné narůstající bolesti během nošení musí pacient uvědomit lékaře.
- Použitelné při ABPI nad 0,8. Při ABPI 0,5 až 0,8 používejte pouze pod lékařským dohledem.
- Známa alergie a/nebo precitlivlost na složku výrobku.

Pokyny k použití:

- Připrava:
 - Před přiložením obvazu je nutné stávající ránu vyčistit / chirurgicky ošetřit a podle stavu ji zakrýt obvazem na rány.
 - Oblasti ohrožené tlakem případně polstrujte.
 - Doporučuje se obvaz přiložit ráno před vstáním nebo po zvednutí nohy na delší dobu a poté pacienta požádat o nácvik chůze.
 - Šírka obinadla by měla odpovídat průměru obvazované části těla.
- Použití:
 - Varicex® lze přiložit pomocí různých technik. Technika oviení se provádí po dohodě s ošetřujícím lékařem.
 - K dosažení maximálního pohybu kloubu se doporučuje obvaz přiložit na chodidlo ohnuté v pravém úhlu (90°) k noze.
 - Ob